



Plan Sanitario Caprino

<i>Medida Sanitaria</i>	<i>Enfermedad</i>	<i>Producto Medicamentoso</i>
<i>Vacunación</i>	* <i>Aborto Paralítico</i> * <i>Chlamidiasis</i> * <i>Neumonía</i>	<i>BEDSA-VAC</i> <i>dosis adultos 2 ml. (SC o IM)</i> <i>antes y después de la cubrición</i> <i>baifos 1 ml. entre los 15 - 20</i> <i>días para proteger contra la</i> <i>neumonía.</i> <i>Revacunación anual.</i>
	* <i>Enterotoxemia</i> * <i>Hemoglobinuria</i> * <i>Hepatitis Infecciosa</i> * <i>Tétanos</i>	<i>POLIVASCOL 9</i> <i>3 ml. (SC), segunda dosis 2 ml.</i>
	* <i>Enterotoxemia</i> * <i>Carbunco Sintomático</i> * <i>Edema Maligno</i>	<i>CYOVAX TOXOIDE</i> <i>3 ml. adultos</i> <i>2 ml. baifos</i>
	* <i>Enterotoxemias</i>	<i>COVEXIN-8</i> <i>5 ml., segunda dosis 5 ml. a las</i> <i>cabras y 3 ml. a las ovejas.(SC)</i>
	* <i>Mastitis Gangrenosa</i> <i>(Estafilocócida)</i>	<i>Se practica cuando la enferme_</i> <i>dad suponga un problema. Se</i> <i>realizan autovacunas y se</i> <i>aplican a hembras adultas du_</i> <i>rante la gestación o inmedia_</i> <i>mente post-parto.</i> <i>BACTERINA C</i> <i>3ml. (SC), repetir 5 ml. a los 15</i> <i>días.</i> <i>GANGRESINA</i> <i>2 ml. (SC), repetir a los 20 - 30</i> <i>días.</i> <i>GANGREVAC</i> <i>2ml. (SC), repeti a los 30 días.</i>
	* <i>Pedero</i> * <i>Mastitis Gangrenosa</i>	<i>PEDIVAC</i> <i>2 ml. (SC), revacunación a los</i> <i>30 días.</i>

<i>Medida Sanitaria</i>	<i>Enfermedad</i>	<i>Producto Medicamentoso</i>
<i>Desparasitación (Endoparásitos)</i>	* <i>Nematodos</i> * <i>Distomas</i> * <i>Tenias</i>	<i>OVIDAX</i> (<i>Albendazol</i>) 2 ml./ 10 Kg. <i>HEPASIL (5%)</i> (<i>Netobimin</i>) 3 ml./ 20 Kg. No dar a cabras en primer tercio de la gestación o en lactación. <i>CALIERMISOL</i> (<i>Levamisol</i>) 1 ml./ 10 Kg. (IM). No dar a sementales ni a hembras en último tercio de gestación.
	* <i>Coccidios</i>	<i>VECOXAN</i> (<i>Diclazuril</i>) 1 ml./ 2,5 Kg. (PO), a crias entre 15 -20 dias en dosis única
<i>Desparasitación (Ectoparásitos)</i>	* <i>Acaros, piojos, pulgas, garrapatas</i>	<i>BARRICADE</i> (<i>Cipermetrina</i>) 1 ml./ litro de agua por aspersión. Aplicación mensual.
<i>Desinfección de corrales</i>	—	<i>FINVIRUS</i> (<i>Cresol 200 mg.</i>) 25 ml. / litro de agua por aspersión o lavado a razón de 1 litro por cada 5 metros cuadrados de superficie. Aplicación semanal.

Medida Sanitaria	Enfermedad	Producto Medicamentoso
<i>Desinsectación / Desparasitación de corrales</i>	<i>* Acaros, insectos, piojos, pulgas</i>	<i>INSECTICIDA E (Fenclorfos, Diclorvos) 1 litro / 50 litros de agua por aspersión a razón e 1 litro c/ 25 metros cuadrados de superficie Aplicación mensual.</i>
	<i>* Acaros, piojos, pulgas, moscas, mosquitos, cucarachas, etc.</i>	<i>DIPACXON 39 200 ml. c/ 10 litros de agua, por pulverización.</i>
	<i>* Acaros, moscas, mosquitos, pulgas</i>	<i>ISIVEX 20 a 50 ml. por litro de agua a razón de 1 litro c/ 100 metros cuadrados de superficie.</i>
<i>Otras actividades sanitarias</i>	<i>* Abortos por Mycoplasma</i>	<i>Se realiza autovacunas.</i>
	<i>* Viruela / Ectima Contagioso</i>	<i>Enfermedades de aparición esporádica. Si aparecen se procede a vacunar colectivamente a todos los animales. VAC. ECTIMA CONTAGIOSO 0,5 ml./ animal (SC)</i>
	<i>* Tuberculosis * Brucelosis * Agalactia Contagiosa</i>	<i>Enfermedades insidiosas. Se realizan chequeos sintomáticos y toma de muestras de sangre.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Cuarentena de animales procedente de distitos orígenes.</i> ✓ <i>Aplicación de tratamientos para distintas patologías.</i> ✓ <i>Toma de muestras de sangre de un 5 % de la población para control de patologías y evaluación del estado colectivo.</i> ✓ <i>Toma de muestras de heces para conocer parasitosis frecuentes y efectividad de los tratamientos.</i> 	—	—

